

ローヤルゼストンG

滋養強壮剤



使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹等
消化器	胃部不快感、悪心等

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢、便秘

成分・分量

1日量1瓶（50mL）中

ローヤルゼリー	……………500mg
オウセイエキス（黄精432.9mgに相当）	……………130mg
ニンジンエキス（人参670mgに相当）	……………100mg
インヨウカクエキス（淫羊藿1600mgに相当）	……………160mg
トコフェロール酢酸エステル	……………10mg
ピリドキシン塩酸塩	……………10mg
タウリン	……………1000mg
無水カフェイン	……………25mg

（アルコール1.0mL以下）
添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、白糖、グリシン、クエン酸水和物、dl-リンゴ酸、クエン酸Na水和物、フマル酸Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、エチルアルコール、グリセリン、ハニリン、プロピレングリコール、香料を含有する。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人（15歳以上）1回1瓶（50mL）を1日1回服用する。
15歳未満は服用しないでください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 一度フタを開けた後は、使用期限内でも、長期保存による服用はしないでください。

※ 本剤は生薬成分を配合した内服液です。まれに洗ってんを生じることがありますが、よく振ってから服用してください。

製造販売元

明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地
お客様相談室 ☎0120-53-3451
9:00～17:00（土、日、祝日、特定休日を除く）